

Горячие тригонометрические формулы

В данный обзор я включу ходовые тригонометрические формулы, которые наиболее часто используются в ходе решения задач по высшей математике.

Знать обязательно или держать под рукой необходимо:

Основное тригонометрическое тождество:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

и некоторые вещи, которые из него следуют:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = (1 - \sin \alpha)(1 + \sin \alpha)$$

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = (1 - \cos \alpha)(1 + \cos \alpha)$$

Простейшие манипуляции с тангенсом и котангенсом – чтобы от них избавиться или, наоборот – «собрать» из синуса и косинуса:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Формулы двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

Есть еще тангенс двойного угла, но я не припомню, чтобы в практических заданиях он где-то требовался, экзотика, одним словом.

! Очень важные следствия из данных формул:

$$1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$$

$$1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha$$

или, то же самое, в другом виде:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}, \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$$

Запомните их, или держите под рукой, наткаться в вышке на данные формулы будете на каждом шагу!

Данные преобразования часто выполняются при вычислении пределов, производных, интегралов

Пожалуйста, обратите также внимание, на тот факт, что параметр α может быть не только буквой x , но и сложной функцией, например:

$$\sin^2(x^2 + 4x - 10) + \cos^2(x^2 + 4x - 10) = 1$$

$$\sin 3x = \sin\left(2 \cdot \frac{3x}{2}\right) = 2 \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{3x}{2}$$

$$\operatorname{tg}(\ln x + 3) = \frac{\sin(\ln x + 3)}{\cos(\ln x + 3)}$$

А теперь рассмотрим формулы, которые используются реже:

Полезно знать о взаимосвязи тангенса и котангенса:

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1, \operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$$

а то, *иногда*, хитрый преподаватель подсунет что-нибудь вроде $\frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$, и потом сидишь, не знаешь, что с этим делать.

Упомянем также экзотический секанс и косеканс:

$$\operatorname{sec} \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}, \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} \dots \text{и всего-то лишь} \dots$$

Студентов-заочников, обычно секансами не пугают, а у очников, нет-нет, да и проскакивает.

Иногда (обычно в интегралах), приходится использовать формулы:

$$\operatorname{tg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \operatorname{ctg}^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

И на самом деле – это не самостоятельные формулы, а следствия основного тригонометрического тождества

Ну и еще куча похожих друг на друга формул:

Сразу скажу, что у данной группы формул есть одно замечательное свойство – упорно не запоминаться. Я сотни раз искал их в справочнике, так и не запомнилась ни одна.

Раз:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

Два:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{2}$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2}$$

Три:

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

Есть еще аналогичные формулы для тангенсов и котангенсов, но о них не будем, в 99,9% случаях – не встретите.

Что-нибудь из перечисленных формул «Раз, Два, Три» иногда требуется применить для преобразований в пределах и подынтегральных выражениях.

ИНОГДА требуются.

Но требуются.

О гиперболических синусах, косинусах умолчим... По-крайне мере, пока. Ими запугивают еще реже, чем секансами, да и то, только зазнавшихся отличников ☺

Еще раз подчеркиваю, что во ВСЕХ тригонометрических формулах параметры α и β могут быть не только буквами x и y , но и сложными выражениями, функциями.

Успехов!